

- СОТАЛОЛ (СОТАГЕКСАЛ) 160 мг 1/4 т 2 раза в день
(под контролем пульса не менее 56 в минуту) длительно.
- РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРОТИАЗИД (ХАРТИЛ Д или РАМАЗИД Н) 5\25 мг. 1\2 т 1 р
в день длительно. под контролем АД.
- ДИЭТИЛАМИНОПРОПИОНИЛЭТОКСИКАРБОНИЛАМИНОФЕНОТИАЗИНА ГИДРОБРОМИД
(ЭТАЦИЗИН) 50 мг.-1\2т.-3 раза в день.
- АТОРВАСТАТИН (АТОРИС или ТОРВАКАРД или ТУЛИП или ЛИПРИМАР) 10 мг. 1 т.
после ужина длительно, с контролем липидограммы, КФК, АСТ, АЛТ через 3
месяца по месту жительства.
- ЭТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ ОМЕГА 3 КИСЛОТ (ОМАКОР) 1 гр. 1 капс. 1 р в день прием
курсами по 1 мес.
- ВАРФАРИН 2,5 мг 1,5 т прием с 17.00 до 19.00 (контроль МНО через
каждые 3-5 дней)
При МНО выше 3,0 дозу варфарина уменьшить на 1\4 т.
При МНО меньше 2,0 дозу варфарина увеличить на 1\4 т.
При достижении целевых показателей МНО 2-3 контроль 1 раз в месяц.
- При невозможности контроля МНО или непереносимости варфарина -
ДАБИГАТРАН (ПРОДАКСА) 110мг.1т 2 р в день ИЛИ
РИВАРОКСАБАН (КСАРЕЛТО) 20мг 1т в сутки.

Конс. Энок Биссопич
-Контрольное посещение через 4-6 нед. на фоне проводимой терапии.

С ранее назначенными медикаментами специалистами ДЦ ознакомлен.

Рекомендованные лекарственные препараты
Вы можете приобрести в "АПТЕКЕ ЦЕНТР",
которая расположена в двухэтажном здании
при выходе из диагностического центра слева.

Врач:

Зубцова Елена Николаевна